I'm not a bot

Antitusivo no opioide - De acción periférica. Composición Un mL contiene 6 mg de Levodropropizina. Propiedades Mecanismo de acción: LEVOPRONT® modula la liberación de los neuropéptidos sensoriales que amplifican la respuesta del reflejo tusígeno. LEVOPRONT® no causa interferencia con el centro respiratorio del tronco cerebral; por lo tanto, no afecta la paCO2 - Presión Arterial de Dióxido de Carbono - y la paO2 -Presión Arterial de Oxígeno-. Indicaciones LEVOPRONT® está indicado para el tratamiento sintomático de la tos improductiva en adultos y niños mayores de 2 años de edad. Dosis Adultos y niños mayores de 12 años: 10 mL de LEVOPRONT® jarabe 3 veces al día en intervalos no inferiores a 6 horas salvo que el médico establezca otra pauta. Niños mayores de 2 años de edad: la dosis pediátrica es 3 mg/Kg/día, divididos en 3 tomas diarias a intervalos no inferiores a 6 horas. Para mayor comodidad se pueden utilizar las siguientes dosis aproximadas:LEVOPRONT® debe continuarse hasta que desaparezca la tos, durante un período no superior a 7 días. Si los síntomas no desaparecen después de este período es aconsejable consultar al médico. Uso en los pacientes de la tercera edad: La dosis de LEVOPRONT® deberá determinarse cuidadosamente. El medicamento se administra por vía oral, debe tomarse alejado de los alimentos, como mínimo una hora antes o después de las comidas, ya que los efectos de su administración junto con estos aún no han sido determinados. Contraindicaciones LEVOPRONT® no debe utilizarse en aquellos casos en los que se tiene conocimiento o se sospecha hipersensibilidad al ingrediente activo, o bien en pacientes con hipersecreción bronquial, en los casos de función mucociliar reducida (síndrome de Kartagener, discinesia del cilio bronquial), en insuficiencia hepática severa, durante el embarazo, o en mujeres en período de lactancia, así como en niños menores de 2 años. Precauciones Uso en Insuficiencia Renal: La Levodropropizina deberá utilizarse únicamente después de hacer una valoración minuciosa del riesgo-beneficio en pacientes con insuficiencia renal. Uso en el paciente diabético: El jarabe contiene 3.5 g de sacarosa por 10 mL. Uso en niños: No se ha establecido hasta ahora la eficacia y seguridad de Levodropropizina en niños menores de 2 años. Efectos sobre la capacidad para manejar vehículos de motor o utilizar maquinaria: La capacidad en actividades como manejo de maquinaria o vehículos puede verse afectada al utilizar el medicamento como se prescribe. Interacciones Es necesario ser cauteloso en el caso de administración concomitante de sedantes. A pesar de que en estudios clínicos no se han podido observar interacciones con las benzodiazepinas, se recomienda tomar precauciones con los pacientes particularmente sensibles, que estén tomando sedantes. Conservación Almacenar a temperatura inferior a 30 °C en su envase y empaque original. Presentación LEVOPRONT® Jarabe frasco de 120 mL con tapa dosificadora (Reg. San. INVIMA 2009 M-13520 R1). Precio y ubicación Tenemos relaciones con diferentes laboratorios y es posible que Laboratorios Bagó de Colombia S.A.S. nos haya dado información que nos permita aclararte ¿dónde se consigue LEVOPRONT? o ¿cuánto cuesta LEVOPRONT?. Sólo déjanos un comentario abajo o envíanos un mensaje usando nuestra sección de contacto. Fotos de LEVOPRONT 2 preguntas sobre LEVOPRONT New search

Hide text from GuidelinesR RESPIRATORY SYSTEM Inhaled antiinfectives are classified in ATC group J - Antiinfectives for systemic use. R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS This group comprises a large number of preparations, most of which are combined preparations.Cold preparations containing therapeutic levels of antiinfectives should be classified in ATC group J - Antiinfectives for systemic use.Cold preparations with therapeutic levels of analgesics/anti-inflammatory agents should be classified in the respective N02/M01 groups.Cold preparations with both antiinfectives and analgesics should be classified in ATC group J - Antiinfectives for systemic use.Cold preparations with minimal amounts of analgesics are classified in R05X - Other cold preparations.See also R01 - Nasal preparations, R02 - Throat preparations, andR03D - Other systemic drugs for obstructive airway diseases.Fixed DDDs are assigned for combinations. These DDDs are based on an average dose regimen of three times daily, and dosages in the upper area of the recommended dose ranges are chosen. The strengths of the various components are not taken into consideration. E.g. 6 UD (= 30 ml) is the fixed DDD for products where the recommended dose is 5-10 ml each time administered. R05D COUGH SUPPRESSANTS, EXCL. COMBINATIONS WITH EXPECTORANTS Combined preparations are classified at separate 5th levels using the code number 20 (R05DA20 and R05DB20). These may also contain bronchodilating agents, antihistamines etc.Combinations with expectorants, see R05F.Combinations with xanthines, see R03DA.Preparations, which contain small amounts of herbal extracts, menthol etc., are not regarded as combined preparations. R05DB Other cough suppressants All combined products of other cough suppressants are classified in R05DB20.Levocloperastine is classified together with cloperastine in R05DB21. ATC code Name DDD U Adm.R Note R05DB27 levodropropizine 0.12 g O List of abbreviations

¿Qué fármaco levodropropizina? ¿Para qué sirve la levodropropizina? La levodropropizina es un medicamento que se usa para aliviar la tos en adultos y niños, especialmente la tos seca sin flemas. Este fármaco está clasificado como supresor antitusivo. La levodropropizina actúa afectando el sistema nervioso central, en particular, que proporciona una señal o reflejo en el sistema respiratorio para toser. Este medicamento está disponible en forma de jarabe. Una de las marcas comerciales de este medicamento es Levopront. ¿Cómo se usa la levodropropizina? La levodropropizina es un medicamento que debe tomarse con el estómago vacío. Esto significa que debe tomar este medicamento dentro de los 30 minutos antes de comer. Tome este jarabe para la tos de acuerdo con las instrucciones de uso que figuran en la etiqueta del envase o de acuerdo con las reglas para tomar el medicamento que le haya dado su médico. Asegúrese de agitar el almíbar antes de beberlo. Además, evite usar una cuchara casera, como una cucharada o una cucharadita, para verter el almíbar. Esto se debe a que es posible que la dosis del medicamento en jarabe no sea la correcta. Utilice siempre una cuchara medicada que viene en el paquete. No use este medicamento por más de la dosis recomendada, por menos o por más tiempo que la dosis recomendada. Si no está seguro de la información que figura en la lista, comuníquese con su médico o farmacéutico. Informe a su médico si su afección persiste o empeora, o si aparecen nuevos síntomas. Si cree que tiene un problema médico grave, busque ayuda médica de inmediato. ¿Cómo se almacena la levodropropizina? Guarde la levodropropizina a temperatura ambiente, lejos de la luz directa y lugares húmedos. No lo guardes en el baño. No lo congele. Otras marcas de este medicamento pueden tener diferentes reglas de almacenamiento. Siga las instrucciones de almacenamiento en el paquete del producto o pregunte a su farmacéutico. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. No tire este medicamento por el inodoro ni por el desagüe a menos que se le indique. Deseche este producto cuando el medicamento haya expirado o cuando ya no sea necesario. Consulte a su farmacéutico o agencia local de eliminación de desechos sobre cómo desechar su medicamento de manera segura. Dosis de levodropropizina La información proporcionada no sustituye el consejo médico. SIEMPRE consulte a su médico o farmacéutico antes de iniciar el tratamiento. ¿Cuál es la dosis de levodropropizina para adultos? La dosis de este medicamento para adultos es de 60 mg 3 veces al día. Tome este medicamento durante 7 días. ¿Cuál es la dosis de levodropropizina para niños? La dosis de levodropropizina como analgésico para la tos en niños es la siguiente: 2 años y más: 1 mg / kg 3 veces al día 12 años y más: 60 mg / kg 3 veces al día El tratamiento se lleva a cabo durante un máximo de 7 días. ¿En qué dosis está disponible la levodropropizina? La levodropropizina está disponible en forma de jarabe. Una de las marcas comerciales de este medicamento es Levopront, con un tamaño de 120 ml. Cada 5 ml de jarabe de Levopront contienen 30 mg de levodropropizina. Efectos secundarios de levodropropizine ¿Qué efectos secundarios se pueden experimentar debido a la levodropropizina? Al igual que otros medicamentos, este medicamento también tiene riesgo de causar efectos secundarios. Los siguientes son efectos secundarios comunes: náusea mordaza acidez Diarrea fatiga cojear mareado dolor de cabeza Según una revista deMedicina respiratoria multidisciplinar,Otros efectos secundarios más graves de la levodropropizina son: perder alerta somnoliento dependencia dificil de dormir dificil respirar Si experimenta una reacción alérgica (anafiláctica) grave a este medicamento, busque atención médica de inmediato. Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir: erupción cutánea con picazón respiración dificultosa hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta No todo el mundo experimenta los siguientes efectos secundarios. Puede haber algunos efectos secundarios no mencionados anteriormente. Si le preocupan ciertos efectos secundarios, consulte a su médico o farmacéutico. Advertencias y precauciones del fármaco levodropropizina ¿Qué se debe saber antes de usar levodropropizina? Antes de usar este medicamento, preste atención a lo siguiente: Es alérgico a la levodropropizina cantidad excesiva de moco y función mucociliar limitada trastornos hepáticos graves ¿Este medicamento es seguro para mujeres embarazadas y lactantes? No existe una investigación adecuada sobre los riesgos del uso del medicamento levodropropizina en mujeres embarazadas o en período de lactancia. Siempre consulte a su médico para sopesar los posibles beneficios y riesgos antes de usar este medicamento. Este medicamento está en la categoría D de riesgo de embarazo según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). A continuación, se hace referencia a las categorías de riesgo de embarazo según la FDA: A = sin riesgo B = sin riesgo en algunos estudios C = puede haber algunos riesgos D = evidencia positiva de riesgo X = contraindicado N = desconocido Todavía no hay suficiente información sobre la seguridad del uso de este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Siempre consulte a su médico para sopesar los posibles beneficios y riesgos antes de usar este medicamento. Interacciones farmacológicas de la levodropropizina ¿Qué medicamentos pueden interactuar con la levodropropizina? Las interacciones medicamentosas pueden cambiar el rendimiento de sus medicamentos o aumentar el riesgo de efectos secundarios graves. No todas las posibles interacciones medicamentosas se enumeran en este artículo. Mantenga una lista de todos los productos que usa (incluidos los medicamentos recetados / sin receta y los productos herbales) y consulte a su médico o farmacéutico. No empiece, suspenda ni cambie la dosis de ningún medicamento sin la aprobación de su médico. Evite tomar medicamentos sedantes, hipnóticos y antihistamínicos sedantes junto con este medicamento. ¿Pueden los alimentos o el alcohol interactuar con este medicamento? Ciertos medicamentos no deben usarse al comer ciertos alimentos porque pueden ocurrir interacciones entre medicamentos y alimentos. Fumar tabaco o consumir alcohol con ciertas drogas también puede causar interacciones. Hable sobre su uso de drogas con alimentos, alcohol o tabaco con su médico, equipo médico o farmacéutico. ¿Qué condiciones de salud pueden interactuar con la levodropropizina? Cualquier otra condición de salud que tenga puede afectar el uso de este medicamento. Informe siempre a su médico si tiene otros problemas de salud, especialmente antecedentes de problemas renales o enfermedad grave. Sobredosis de levodropropizina ¿Qué debo hacer en caso de emergencia o sobredosis? En caso de una emergencia o síntomas de una sobredosis, comuníquese con el proveedor de servicios de emergencia local (118 o 119) o inmediatamente al departamento de emergencias del hospital más cercano. ¿Qué debo hacer si me olvido de una dosis? Si olvida una dosis del medicamento levodropropizina, tómela lo antes posible. Sin embargo, cuando esté cerca de la hora de la siguiente dosis, omita la dosis olvidada y vuelva al horario de dosificación habitual. No duplique la dosis en un solo uso. Hello Health Group no proporciona asesoramiento, diagnóstico ni tratamiento médico.

La levodropropizina es un antitusígeno indicado para el tratamiento de la tos seca, no productiva, e irritativa, causada por bronquitis, laringitis, infecciones o alergias del tracto respiratorio, pues actúa inhibiendo el reflejo de la tos, relajando la musculatura de los bronquios y mejorando la ventilación pulmonar. Este medicamento puede encontrarse en farmacias en forma de jarabe, gotas o tabletas, bajo los nombres comerciales de Tautoss, Zyplo, Velatuss o Levopront, por ejemplo. La levodropropizina puede ser empleada por adultos y niños mayores de 2 años de edad, siempre que haya sido indicado por el médico, pues puede ocasionar efectos secundarios como palpitaciones cardíacas, dolor abdominal, somnolencia o debilidad muscular. Para qué sirve La levodropropizina sirve para el tratamiento de la tos seca e irritativa, causada por las siguientes afecciones: Bronquitis; Traqueitis; Laringitis; Infecciones o alergias de las vías respiratorias. Este medicamento actúa reduciendo la excitación de los receptores en el árbol bronquial y, de esta forma, bloqueando la transmisión de impulsos nerviosos hacia el centro de la tos en el cerebro, inhibiendo este reflejo. Asimismo, la levodropropizina ayuda a relajar la musculatura de los bronquios y mejora la ventilación pulmonar. La levodropropizina debe ser empleada bajo indicación del neumólogo o pediatra, que debe indicar las dosis de manera individualizada y el tiempo de tratamiento de acuerdo con la condición a tratar. ¿La levodropropizina es un antialérgico? La levodropropizina no es un antialérgico y no posee ninguna sustancia antialérgica en su composición. Sin embargo, pese a que no sea un medicamento antihistamínico, este medicamento reduce los espasmos bronquiales causados por la histamina, promoviendo la relajación de la musculatura lisa bronquial, ayudando a aliviar la tos alérgica. Ambroxol con levodropropizina La levodropropizina puede estar asociada con el ambroxol para tratar la tos productiva, pues el ambroxol ayuda a la fluidificar las secreciones y a liberar la mucosidad. Este medicamento puede encontrarse bajo los nombres comerciales de Dizolvin Flux, Supratex Dac, entre otros. Dosis de levodropropizina y cómo tomar La levodropropizina puede tomarse en jarabe, gotas o tabletas debiendo ingerirse por vía oral, entre las comidas, en los horarios establecidos por el médico. La dosis de la levodropropizina varía según la edad y la presentación del medicamento, como se indica a continuación: 1. Levodropropizina en jarabe La dosis del jarabe de levodropropizina varían con la edad e incluye: Adultos o niños mayores de 12 años: 10 ml del jarabe, hasta 3 veces al día, con al menos 6 horas de intervalo entre las dosis; Niños de 2 a 12 años: la dosis es de 1 mg por cada kg de peso corporal, hasta 3 veces al día, es decir, la dosis máxima no debe exceder 3 mg/kg de peso corporal por día. Las dosis de la levodropropizina deben ser medidas utilizando el vaso medidor suministrado en el empaque. El tiempo de tratamiento con la levodropropizina en jarabe debe ser indicado por el médico, y en caso de que no ocurra mejoría de la tos luego de 4 o 5 días de tratamiento o surjan otros síntomas, se debe volver a acudir al médico. Vea otros jarabes para la tos que pueden ser indicados por el médico. 2. Levodropropizina en gotas La dosis de la solución oral en gotas de levodropropizina para niños mayores de 2 años es de 1 mg por cada kg de peso corporal, hasta 3 veces al día. La dosis máxima diaria no debe exceder 3 mg/kg de peso corporal al día, o 120 gotas. Las gotas de levodropropizina pueden ser diluidas en un poco de agua para facilitar la ingesta. El tratamiento con la levodropropizina en gotas para niños mayores de 2 años de edad debe ser orientado por el pediatra, así como el cálculo de las dosis. 3. Levodropropizina en tabletas La dosis de las tabletas o comprimidos de levodropropizina para adultos y niños mayores de 12 años debe ser indicada por el médico; no obstante, la dosis habitual es de 1 tableta de 60 mg cada 8 horas, tomadas con un vaso de agua, durante un máximo de 7 días consecutivos. Las tabletas de levodropropizina no deben ser tomadas junto con alimentos. Posibles efectos secundarios Los efectos secundarios más comunes de la levodropropizina son palpitación cardíaca, vómitos, diarrea, dolor abdominal, cansancio excesivo, debilidad, falta de energía o somnolencia. Asimismo, también pueden surgir otros efectos secundarios menos comunes, como dolor o molestias en el pecho, dolor de cabeza, mareos, entumecimiento, enrojecimiento de los ojos o rash cutáneo. Conozca cómo identificar los síntomas de rash cutáneo. ¿La levodropropizina da sueño? Sí, la levodropropizina da sueño, siendo la somnolencia uno de los efectos secundarios comunes de este medicamento. Por esta razón, se debe usar con precaución o evitar actividades como conducir, utilizar maquinaria pesada o realizar actividades peligrosas durante el tratamiento con la levodropropizina. Contraindicaciones La levodropropizina no debe ser empleada por niños menores de 2 años de edad, mujeres embarazadas o en período de lactancia ni por personas que sean alérgicas a este medicamento o a cualquier otro componente de la fórmula. Asimismo, este medicamento debe ser empleado con cautela por personas que tienen insuficiencia renal o hepática graves, hipersecreción bronquial o disminución de la motilidad de los cilios bronquiales. La levodropropizina también debe ser evitada por personas que utilizan medicamentos, como benzodiazepinas, fenitoína o imipramina, pues puede aumentar el efecto secundario de somnolencia. El jarabe de levodropropizina contiene sacarosa, por lo cual debe ser utilizado con precaución en personas diabéticas. InChI=1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1InChIKeyInChIKey=PTVWPYVOOKLBCG-ZDUSSCGKSA-NSMILESC([C@@H](CO)O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2Canonical SMILESOCC(O)CN1CCN(C=2C=CC=CC2)CC1Other Names for this Substance1,2-Propanediol, 3-(4-phenyl-1-piperazinyl)-, (2S)-1,2-Propanediol, 3-(4-phenyl-1-piperazinyl)-, (S)-(2S)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol(-)-DropropizineLevodropropizine

La levodropropizina es un antitusígeno indicado para el tratamiento de la tos seca, no productiva, e irritativa, causada por bronquitis, laringitis, infecciones o alergias del tracto respiratorio, pues actúa inhibiendo el reflejo de la tos, relajando la musculatura de los bronquios y mejorando la ventilación pulmonar. Este medicamento puede encontrarse en farmacias en forma de jarabe, gotas o tabletas, bajo los nombres comerciales de Tautoss, Zyplo, Velatuss o Levopront, por ejemplo. La levodropropizina puede ser empleada por adultos y niños mayores de 2 años de edad, siempre que haya sido indicado por el médico, pues puede ocasionar efectos secundarios como palpitaciones cardíacas, dolor abdominal, somnolencia o debilidad muscular. Para qué sirve La levodropropizina sirve para el tratamiento de la tos seca e irritativa, causada por las siguientes afecciones: Bronquitis; Traqueitis; Laringitis; Infecciones o alergias de las vías respiratorias. Este medicamento actúa reduciendo la excitación de los receptores en el árbol bronquial y, de esta forma, bloqueando la transmisión de impulsos nerviosos hacia el centro de la tos en el cerebro, inhibiendo este reflejo. Asimismo, la levodropropizina ayuda a relajar la musculatura de los bronquios y mejora la ventilación pulmonar. La levodropropizina debe ser empleada bajo indicación del neumólogo o pediatra, que debe indicar las dosis de manera individualizada y el tiempo de tratamiento de acuerdo con la condición a tratar. ¿La levodropropizina es un antialérgico? La levodropropizina no es un antialérgico y no posee ninguna sustancia antialérgica en su composición. Sin embargo, pese a que no sea un medicamento antihistamínico, este medicamento reduce los espasmos bronquiales causados por la histamina, promoviendo la relajación de la musculatura lisa bronquial, ayudando a aliviar la tos alérgica. Ambroxol con levodropropizina La levodropropizina puede estar asociada con el ambroxol para tratar la tos productiva, pues el ambroxol ayuda a la fluidificar las secreciones y a liberar la mucosidad. Este medicamento puede encontrarse bajo los nombres comerciales de Dizolvin Flux, Supratex Dac, entre otros. Dosis de levodropropizina y cómo tomar La levodropropizina puede tomarse en jarabe, gotas o tabletas debiendo ingerirse por vía oral, entre las comidas, en los horarios establecidos por el médico. La dosis de la levodropropizina varía según la edad y la presentación del medicamento, como se indica a continuación: 1. Levodropropizina en jarabe La dosis del jarabe de levodropropizina varían con la edad e incluye: Adultos o niños mayores de 12 años: 10 ml del jarabe, hasta 3 veces al día, con al menos 6 horas de intervalo entre las dosis; Niños de 2 a 12 años: la dosis es de 1 mg por cada kg de peso corporal, hasta 3 veces al día, es decir, la dosis máxima no debe exceder 3 mg/kg de peso corporal por día. Las dosis de la levodropropizina deben ser medidas utilizando el vaso medidor suministrado en el empaque. El tiempo de tratamiento con la levodropropizina en jarabe debe ser indicado por el médico, y en caso de que no ocurra mejoría de la tos luego de 4 o 5 días de tratamiento o surjan otros síntomas, se debe volver a acudir al médico. Vea otros jarabes para la tos que pueden ser indicados por el médico. 2. Levodropropizina en gotas La dosis de la solución oral en gotas de levodropropizina para niños mayores de 2 años es de 1 mg por cada kg de peso corporal, hasta 3 veces al día. La dosis máxima diaria no debe exceder 3 mg/kg de peso corporal al día, o 120 gotas. Las gotas de levodropropizina pueden ser diluidas en un poco de agua para facilitar la ingesta. El tratamiento con la levodropropizina en gotas para niños mayores de 2 años de edad debe ser orientado por el pediatra, así como el cálculo de las dosis. 3. Levodropropizina en tabletas La dosis de las tabletas o comprimidos de levodropropizina para adultos y niños mayores de 12 años debe ser indicada por el médico; no obstante, la dosis habitual es de 1 tableta de 60 mg cada 8 horas, tomadas con un vaso de agua, durante un máximo de 7 días consecutivos. Las tabletas de levodropropizina no deben ser tomadas junto con alimentos. Posibles efectos secundarios Los efectos secundarios más comunes de la levodropropizina son palpitación cardíaca, vómitos, diarrea, dolor abdominal, cansancio excesivo, debilidad, falta de energía o somnolencia. Asimismo, también pueden surgir otros efectos secundarios menos comunes, como dolor o molestias en el pecho, dolor de cabeza, mareos, entumecimiento, enrojecimiento de los ojos o rash cutáneo. Conozca cómo identificar los síntomas de rash cutáneo. ¿La levodropropizina da sueño? Sí, la levodropropizina da sueño, siendo la somnolencia uno de los efectos secundarios comunes de este medicamento. Por esta razón, se debe usar con precaución o evitar actividades como conducir, utilizar maquinaria pesada o realizar actividades peligrosas durante el tratamiento con la levodropropizina. Contraindicaciones La levodropropizina no debe ser empleada por niños menores de 2 años de edad, mujeres embarazadas o en período de lactancia ni por personas que sean alérgicas a este medicamento o a cualquier otro componente de la fórmula. Asimismo, este medicamento debe ser empleado con cautela por personas que tienen insuficiencia renal o hepática graves, hipersecreción bronquial o disminución de la motilidad de los cilios bronquiales. La levodropropizina también debe ser evitada por personas que utilizan medicamentos, como benzodiazepinas, fenitoína o imipramina, pues puede aumentar el efecto secundario de somnolencia. El jarabe de levodropropizina contiene sacarosa, por lo cual debe ser utilizado con precaución en personas diabéticas.

La levodropropizina es un antitusígeno indicado para el tratamiento de la tos seca, no productiva, e irritativa, causada por bronquitis, laringitis, infecciones o alergias del tracto respiratorio, pues actúa inhibiendo el reflejo de la tos, relajando la musculatura de los bronquios y mejorando la ventilación pulmonar. Este medicamento puede encontrarse en farmacias en forma de jarabe, gotas o tabletas, bajo los nombres comerciales de Tautoss, Zyplo, Velatuss o Levopront, por ejemplo. La levodropropizina puede ser empleada por adultos y niños mayores de 2 años de edad, siempre que haya sido indicado por el médico, pues puede ocasionar efectos secundarios como palpitaciones cardíacas, dolor abdominal, somnolencia o debilidad muscular. Para qué sirve La levodropropizina sirve para el tratamiento de la tos seca e irritativa, causada por las siguientes afecciones: Bronquitis; Traqueitis; Laringitis; Infecciones o alergias de las vías respiratorias. Este medicamento actúa reduciendo la excitación de los receptores en el árbol bronquial y, de esta forma, bloqueando la transmisión de impulsos nerviosos hacia el centro de la tos en el cerebro, inhibiendo este reflejo. Asimismo, la levodropropizina ayuda a relajar la musculatura de los bronquios y mejora la ventilación pulmonar. La levodropropizina debe ser empleada bajo indicación del neumólogo o pediatra, que debe indicar las dosis de manera individualizada y el tiempo de tratamiento de acuerdo con la condición a tratar. ¿La levodropropizina es un antialérgico? La levodropropizina no es un antialérgico y no posee ninguna sustancia antialérgica en su composición. Sin embargo, pese a que no sea un medicamento antihistamínico, este medicamento reduce los espasmos bronquiales causados por la histamina, promoviendo la relajación de la musculatura lisa bronquial, ayudando a aliviar la tos alérgica. Ambroxol con levodropropizina La levodropropizina puede estar asociada con el ambroxol para tratar la tos productiva, pues el ambroxol ayuda a la fluidificar las secreciones y a liberar la mucosidad. Este medicamento puede encontrarse bajo los nombres comerciales de Dizolvin Flux, Supratex Dac, entre otros. Dosis de levodropropizina y cómo tomar La levodropropizina puede tomarse en jarabe, gotas o tabletas debiendo ingerirse por vía oral, entre las comidas, en los horarios establecidos por el médico. La dosis de la levodropropizina varía según la edad y la presentación del medicamento, como se indica a continuación: 1. Levodropropizina en jarabe La dosis del jarabe de levodropropizina varían con la edad e incluye: Adultos o niños mayores de 12 años: 10 ml del jarabe, hasta 3 veces al día, con al menos 6 horas de intervalo entre las dosis; Niños de 2 a 12 años: la dosis es de 1 mg por cada kg de peso corporal, hasta 3 veces al día, es decir, la dosis máxima no debe exceder 3 mg/kg de peso corporal por día. Las dosis de la levodropropizina deben ser medidas utilizando el vaso medidor suministrado en el empaque. El tiempo de tratamiento con la levodropropizina en jarabe debe ser indicado por el médico, y en caso de que no ocurra mejoría de la tos luego de 4 o 5 días de tratamiento o surjan otros síntomas, se debe volver a acudir al médico. Vea otros jarabes para la tos que pueden ser indicados por el médico. 2. Levodropropizina en gotas La dosis de la solución oral en gotas de levodropropizina para niños mayores de 2 años es de 1 mg por cada kg de peso corporal, hasta 3 veces al día. La dosis máxima diaria no debe exceder 3 mg/kg de peso corporal al día, o 120 gotas. Las gotas de levodropropizina pueden ser diluidas en un poco de agua para facilitar la ingesta. El tratamiento con la levodropropizina en gotas para niños mayores de 2 años de edad debe ser orientado por el pediatra, así como el cálculo de las dosis. 3. Levodropropizina en tabletas La dosis de las tabletas o comprimidos de levodropropizina para adultos y niños mayores de 12 años debe ser indicada por el médico; no obstante, la dosis habitual es de 1 tableta de 60 mg cada 8 horas, tomadas con un vaso de agua, durante un máximo de 7 días consecutivos. Las tabletas de levodropropizina no deben ser tomadas junto con alimentos. Posibles efectos secundarios Los efectos secundarios más comunes de la levodropropizina son palpitación cardíaca, vómitos, diarrea, dolor abdominal, cansancio excesivo, debilidad, falta de energía o somnolencia. Asimismo, también pueden surgir otros efectos secundarios menos comunes, como dolor o molestias en el pecho, dolor de cabeza, mareos, entumecimiento, enrojecimiento de los ojos o rash cutáneo. Conozca cómo identificar los síntomas de rash cutáneo. ¿La levodropropizina da sueño? Sí, la levodropropizina da sueño, siendo la somnolencia uno de los efectos secundarios comunes de este medicamento. Por esta razón, se debe usar con precaución o evitar actividades como conducir, utilizar maquinaria pesada o realizar actividades peligrosas durante el tratamiento con la levodropropizina. Contraindicaciones La levodropropizina no debe ser empleada por niños menores de 2 años de edad, mujeres embarazadas o en período de lactancia ni por personas que sean alérgicas a este medicamento o a cualquier otro componente de la fórmula. Asimismo, este medicamento debe ser empleado con cautela por personas que tienen insuficiencia renal o hepática graves, hipersecreción bronquial o disminución de la motilidad de los cilios bronquiales. La levodropropizina también debe ser evitada por personas que utilizan medicamentos, como benzodiazepinas, fenitoína o imipramina, pues puede aumentar el efecto secundario de somnolencia. El jarabe de levodropropizina contiene sacarosa, por lo cual debe ser utilizado con precaución en personas diabéticas.

La Levodropropizina es un medicamento antitusivo, es decir, que es apropiado para combatir la tos. Nombres comerciales: Kastovin, Levocof, Velatuss, Zyplo, etc. Nombre genérico: Levodropropizina. Presentaciones y Vía de Administración: Jarabe, tabletas y solución. Oral. Sus usos más frecuentes son para: Tos seca / Tos de fumador. Se usa principalmente para la tos del fumador y la tos seca. Sus usos más comunes son: Tos seca o irritativa, la que se manifiesta sin expulsión de mucosidad. Su uso debe ser prescrito por un médico debido a que los síntomas pudieran confundirse con otros ante los que el medicamento no resulta útil. La Levodropropizina solo sirve para aliviar los síntomas y no la enfermedad que los causa, por lo que se debe tomar en tanto persista la enfermedad. Se debe usar en las dosis y por el tiempo que el médico lo considere necesario. Levodropropizina Precio Precio Farmacias del Ahorro Farmacia San Pablo Farmacia Chedraui Farmacia Leal Levodropropizina solución $60 $89 – – Levodropropizina Patente $171 $171 $59 $80.50 Levodropropizina tiene un precio promedio de $74 en su presentación gnérica en solución, esto se traduce en un precio de $0.6 por mililitro. Los precios varían entre farmacias, por ejemplo el precio más barato lo tiene Farmacias del Ahorro con un precio de $60 y el más caro Farmacia San pablo con un precio de $89. Esto representa un aumento de casi el 20% sobre la misma presentación. Para la presentación de patente el caso es distinto, ya que el precio más bajo lo maneja farmacia Chedraui y el más caro San Pablo. El precio cambia entre farmacias y presentaciones, sin embargo, para comprar más barato te sugiero que visites la tienda en línea de Chedraui y del Ahorro, ya que ofrecen precios accesibles, ya sea genérico o de patente **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Enero 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Para encontrar el mejor precio compara varias farmacias en nuestra próxima sección.Presentaciones y forma de administración Tabletas de 60 mg de Levodropropizina en cajas con 10 o 20 comprimidos. Son fabricadas por Armstrong Laboratorios de México en la marca comercial Zyplo. Jarabe en concentración de 6 mg/ml como Levodropropizina, disponible en frascos de 30, 60, 120 y 200 ml. Fabricado por laboratorios Eurodrug, Valeant, Rayere y Armstrong de México, en las marcas comerciales KAstovin, Levocof, Velatuss y Zyplo. Solución gotas de 60 mg/ml como Levodropropizina en frascos con 15 o 30 ml. Es fabricado por los Laboratorios Armstrong en la marca comercial Zyplo. Dosis y usos recomendados por edad Presentación 2 a 12 años Adultos Veces al día Tabletas No 60 mg 3 Jarabe 1 mg/kg 10 ml 3 Gotas 1 mg/kg 20 gotas 3 *Consulta a tu médico para recibir el uso y dosis correcta. El tratamiento oral mediante gotas debe diluirse de preferencia en medio vaso de agua, asegurando de tomar todo el contenido. Por cualquier vía, este medicamento debe tomarse en horarios alejados de la ingesta de alimentos. No se recomiendan tratamientos con duración superior a los 7 días para niños o de 14 en adultos. Generales. La Levodropropizina debe usarse con precaución en personas con insuficiencia renal, hepática y, en el caso del jarabe, en diabéticos. No debe usarse en personas con excesiva secreción en los bronquios o con síndrome de Kartagener. Alergias o hipersensibilidad. No se debe tomar si se es alérgico al medicamento. Mezcla con alcohol. No hay interacciones con el alcohol sobre el sistema nervioso central. Mezclar con otros medicamentos. No se han detectado interacciones, pero se recomiendan precauciones con las benzodiacepinas y otros medicamentos de efectos sedantes. Combinación de la Levodropropizina en embarazo y lactancia EMBARAZO ALTO LACTANCIA ALTO RIESGO ALTO La Levodropropizina no está catalogada por la FDA (Food & Drug Administration). Los estudios en ratas indican que atraviesa la placenta, pero se desconocen sus efectos en personas. Se recomienda usar un medicamento más seguro. Lo mismo señalan los laboratorios fabricantes. Según estudios médicos de e-lactancia.org, la Levodropropizina es probablemente de bajo riesgo, sin embargo, considera que es probable que se filtre en la leche materna debido a su bajo peso molecular. La FDA indica que sí se filtra en la leche y que en ratas todavía han sido detectado rastros del medicamento hasta 8 horas después de la última toma. Los laboratorios fabricantes prohíben su uso en la lactancia. Efectos secundarios La Levodropropizina es muy tolerada por el organismo, por lo que presenta efectos secundarios en raras ocasiones. Estos afectan a menos de 1 de cada 100 personas que lo toman y son: Sistema nervioso central – Fatiga, confusión, entumecimiento, somnolencia, mareos, desvanecimientos y dolor de cabeza. Aparato digestivo – Náuseas, dolor abdominal, gastritis, vómito y diarrea. Aparato circulatorio – Palpitaciones. Con una incidencia inferior a 1 de cada 1000 personas pueden presentarse estos otros efectos colaterales: Trastornos en la piel – Reacciones alérgicas como inflamación, picazón y urticaria. Son más frecuentes al tomar el jarabe. Trastornos de la vista – Visión borrosa. Aparato respiratorio – Disminución de la frecuencia de respiración. Es un medicamento considerado seguro en las dosis indicadas, pero siempre se debe estar atento a las reacciones alérgicas, ya que en caso de presentarse se debe acudir de urgencia a un hospital. De cualquier síntoma también se debe mantener informado al médico para que pueda tomar decisiones acerca de la continuidad del tratamiento y las dosis. Preguntado por: Biel Sanz | Última actualización: 6 de marzo de 2022Puntuación: 4.6/5 (22 valoraciones) La levodropropizina es un antitusígeno de acción periférica que ejerce un efecto anestésico e inhibe las vías aferentes que regulan el reflejo de la tos.¿Cómo se debe tomar el Levodropropizina?Cómo se utiliza: Tabletas de Levodropropizina: Solo indicadas para adultos y se debe administrar 60 mg, 3 veces al día. Jarabe de Levodropropizina Para niños de 2 a 12 años, tomar 1 ml por kg, 3 veces al día, y para adultos 10 ml, 3 veces al día.LEVOTUSS 6 mg/ml Jarabe.LEVOTUSS 60 mg/ml Gotas orales.TAUTOSS 6 mg/ml Jarabe.TOSSEVO 6 mg/ml Jarabe.Vía de administración: Oral. Dosis: No se recomienda su uso por más de 7 días. La dosis en niños es determinada con base en la levodropropizina: 3 mg /Kg /día, dividida en tres tomas, administradas cada 8 horas. La dosis de Ambroxol es de 1.5mg-2 mg/kg de peso/día, dividida en tres tomas, cada 8 horas.LEVOPRONT está indicado para el tratamiento sintomático de la tos improductiva en adultos y niños mayores de 2 años de edad. Antitusivo no opioide. Mecanismo de acción: LEVOPRONT modula la liberación de los neuropéptidos sensoriales que amplifican la respuesta del reflejo tusígeno.33 preguntas relacionadas encontradasComo se debe administrar Levopront? El Levopront sirve para la tos y se deben tomar : 5 ccc cada 8 h en niños y 10 cc cada 8 h en adultos.PERCOF Jarabe. Composición: Cada 10 ml de jarabe contiene: Levodropropizina 60 mg. Excipientes c.s. Acción Terapéutica: Antitusivo.Por lo tanto, puede ser utilizado en pacientes que padezcan de depresión respiratoria junto con tos no productiva. En otros estudios realizados con placebo, levodropropizina mostró ser efectiva en un 80% después de 1 día de tratamiento.en pacientes psicóticos: la dosis recomendada es de 100 a 200 gotas (100 a 200 mg de levomepromazina) diarias, en ocasiones más, repartidas en 2 ó 3 tomas. en pacientes no psicóticos: la dosis recomendada es de 25 a 75 gotas (25 a 75 mg de levomepromazina) diarias, repartidas en 2 ó 3 tomas.Dosis recomendada (c/8 hs): Niños de 2 a 5 años: 2 mL a 3 mL. Niños de 6 a 9 años: 3,5 mL a 5 mL. Niños de 10 a 12 años: 5 mL a 7 mL. Adultos y niños mayores de 12 años: 10 mL.El principio activo es difenhidramina hidrocloruro. Cada comprimido contiene 50 mg de difenhidramina hidrocloruro. Los demás componentes (excipientes) son lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, ácido esteárico, sílice coloidal anhidra y estearato de magnesio.Dextrometorfano. Es considerado el antitusivo de elección. Actúa a escala central, pero sin efectos sedantes, adictivos o analgésicos, y con la misma eficacia que la codeína.En caso de tos intensa se puede incrementar la dosis a 2 mg/kg cada 8 h. El tratamiento no debe exceder los 7 días.Antitusivo indicado para el alivio de la tos en casos de afecciones del aparato respiratorio como bronquitis, neumonía o bronconeumonía en combinación con antibióticos. Caja con frasco con 120 ml. cada ml contiene 6 mg de levodropropizina.Cómo se utiliza:Jarabe: adultos y niños mayores de 12 años, se recomienda administrar 10ml cada 8 horas. Para niños mayores de 2 años, la dosis es de 1mg/kg hasta cada 8 horas. Gotas: adultos y niños mayores de 12 años, administre 20 gotas cada 8 horas. Niños mayores de 2 años, 1mg/kg hasta cada 8 horas.La concentración sérica máxima de la levomepromazina se alcanza en el transcurso de dos a cuatro horas. La administración intramuscular evita gran parte del metabolismo hepático de primer paso y brinda concentraciones perceptibles en el plasma en un plazo de 15 a 30 minutos.Sobredosificación: Los síntomas de sobredosis de neurolépticos incluyen somnolencia, o pérdida de conciencia, hipotensión, taquicardia, cambios en ECG, arritmias ventriculares, e hipotermia. Pueden ocurrir diskinesias extrapiramidales graves.Los efectos adversos más frecuentes de la levomepromazina son: somnolencia, sedación, sequedad de boca, visión borrosa, retención urinaria y estreñimiento. Raramente puede producir otros efectos como hipotensión, insuficiencia cardíaca, arritmias, erupciones, fiebre, rigidez muscular y alteraciones respiratorias.CLOPERASTINA EN VADEMECUM IQB. La cloperastine (en forma de fendizoato) es un farmaco antihistamínico y espasmolítico con un efecto antitussivo central y con una actividad parecida a la de la codeína sin los efectos narcóticos de esta última.Vía de administración: Oral. Dosis usual: Adultos y mayores de 12 años: 10 ml de jarabe 3 veces al día en intervalos no inferiores a 6 horas. Niños mayores de 2 años: La dosis pediátrica es 1 mg/kg cada 8 horas; no administrar la dosis en intervalos menores a 6 horas.levodropropizina: bloquea la liberación de neuropéptidos y sustancias inflamatorias, evitando la activación de las fibras C en la tráquea, bronquios y pulmones. La acción inhibitoria de las fibras C impide que se desencadene el reflejo de la tos, así como la hipersecreción de moco e hiperreactividad bronquial.Está indicado para el tratamiento sintomático de la tos y fluidificante de las secreciones broncopulmonares en: bronquitis aguda y crónica, traqueítis, bronquiectasias, sinusitis aguda y crónica, neumonía, bronconeumonía, atelectasia y traqueostomía.La codeína tiene la consideración de antitusivo de acción central cabeza de serie, por lo que actúa como punto de partida en la comparación del efecto antitusivo de todos los demás activos del grupo. La codeína, también denominada metilmorfina, posee un buen efecto sedante sobre la tos.Entre los mucolíticos que presentan una mayor eficacia destacan los derivados tiólicos (como acetilcisteína) y los derivados de vasicina (como ambroxol y bromhexina).Los medicamentos utilizados para tratar la tos crónica pueden incluir:Antihistamínicos, corticosteroides y descongestionantes. Estos medicamentos son el tratamiento estándar para las alergias y el goteo posnasal.Medicamentos inhalados para el asma. ... Antibióticos. ... Bloqueadores de ácido. Índice

La levodropropizina para que sirve es una pregunta común entre quienes buscan aliviar los síntomas asociados con el padecimiento respiratorio. Esta sustancia farmacológica pertenece a un grupo específico de medicamentos conocidos como antitusígenos periféricos, cuya función principal es reducir o eliminar la tos sin afectar directamente las vías respiratorias superiores. Su mecanismo de acción se centra en inhibir las señales nerviosas responsables del reflejo de tos, lo que permite a las personas experimentar un descanso más profundo y recuperarse más rápidamente.Es importante destacar que la levodropropizina no actúa como un supresor central de la tos, lo que significa que no altera funciones cerebrales clave ni produce efectos sedantes. Este detalle es crucial, ya que muchas personas buscan soluciones seguras y eficaces que no interfieran con su vida diaria. Además, este fármaco ha sido ampliamente estudiado en diversos contextos médicos, demostrando ser una opción confiable para tratar diferentes tipos de tos.Clasificación FarmacológicaDentro de la clasificación farmacológica, la levodropropizina se encuentra en el grupo de los antitusígenos periféricos, específicamente diseñados para atacar las causas locales de irritación en las vías respiratorias. A diferencia de otros antitusígenos, esta molécula no cruza la barrera hematoencefálica, minimizando así cualquier posible efecto secundario relacionado con el sistema nervioso central. Esta característica la convierte en una elección preferida por profesionales médicos cuando se busca un tratamiento seguro y eficiente.¿Para qué sirve?La levodropropizina para que sirve es principalmente utilizada para tratar la tos seca o productiva asociada con diversas enfermedades respiratorias. Específicamente, está indicada en casos de infecciones virales o bacterianas leves a moderadas que afectan las vías respiratorias superiores e inferiores. Además, puede ser útil en situaciones donde la tos persistente interfiere con la calidad de vida del paciente, como durante episodios gripales o resfríos comunes.Uno de los beneficios principales de este medicamento es su capacidad para proporcionar alivio rápido sin comprometer otras funciones vitales del cuerpo. En comparación con otros tratamientos disponibles, la levodropropizina ofrece una alternativa menos invasiva, especialmente para aquellos que requieren mantenerse activos mientras se recuperan.Condiciones Médicas TratadasAlgunas de las condiciones específicas que pueden beneficiarse del uso de la levodropropizina incluyen:Tos asociada con faringitis: La inflamación de la garganta puede provocar un reflejo de tos incómodo que dificulta el descanso.Bronquitis aguda: En esta condición, la irritación bronquial genera una tos persistente que puede ser mitigada con este fármaco.Rinitis alérgica: Las reacciones alérgicas también pueden desencadenar episodios de tos seca que responden favorablemente al tratamiento con levodropropizina.En todos estos escenarios, el objetivo final es mejorar la calidad de vida del paciente mediante el control efectivo de los síntomas respiratorios.Mecanismo de acciónEl mecanismo de acción de la levodropropizina es sumamente interesante y complejo. Este compuesto actúa directamente sobre los receptores sensoriales presentes en las vías respiratorias, bloqueando las señales nerviosas responsables del reflejo de tos. A diferencia de algunos antitusígenos centrales, que afectan áreas específicas del cerebro, la levodropropizina trabaja únicamente a nivel periférico, evitando cualquier tipo de interacción innecesaria con el sistema nervioso central.Cuando una persona inhala partículas irritantes o experimenta inflamación en las vías respiratorias, estas estimulan los receptores sensoriales distribuidos en las paredes de los bronquios y la tráquea. Estos receptores envían señales hacia el centro cerebral responsable del reflejo de tos, generando así el impulso muscular necesario para expulsar dichas partículas. Sin embargo, cuando la levodropropizina entra en juego, bloquea efectivamente estas señales antes de que alcancen el cerebro, permitiendo que el cuerpo se recupere sin la necesidad constante de toser.Proceso FarmacocinéticoDesde el punto de vista farmacocinético, la levodropropizina es absorbida rápidamente tras su administración oral, alcanzando niveles plasmáticos máximos en aproximadamente 1-2 horas. Una vez dentro del organismo, esta molécula se distribuye uniformemente por todo el cuerpo, concentrándose particularmente en tejidos pulmonares y bronquiales, donde ejerce su efecto terapéutico. Posteriormente, es metabolizada por el hígado y excretada principalmente a través de la orina.Este proceso asegura que el fármaco permanezca activo durante un período suficiente para proporcionar alivio continuo sin acumularse en cantidades tóxicas en el cuerpo.Presentaciones y formas de administraciónLa levodropropizina está disponible en múltiples presentaciones para adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente. Las opciones más comunes incluyen tabletas, cápsulas, jarabe y suspensiones orales, además de formulaciones especiales para uso pediátrico. Cada una de estas formas tiene sus propias ventajas dependiendo del contexto clínico y la edad del usuario.Dosis RecomendadasLas dosis recomendadas varían según factores como la edad, peso corporal y severidad de los síntomas. Por ejemplo, en adultos sanos, la dosis típica oscila entre 15 mg y 30 mg cada 8-12 horas, dependiendo de la presentación elegida. Para niños mayores de seis años, se ajusta la cantidad proporcionalmente al peso corporal, siguiendo siempre las instrucciones proporcionadas por un profesional médico.Consideraciones EspecialesEn pacientes ancianos o con problemas hepáticos severos, es fundamental reducir la dosis inicial debido a posibles alteraciones metabólicas que podrían aumentar el riesgo de efectos adversos. Del mismo modo, en casos de insuficiencia renal crónica, debe realizarse un monitoreo cuidadoso para evitar acumulación del fármaco en sangre.Efectos secundarios y contraindicacionesAunque la levodropropizina es generalmente bien tolerada, existen ciertos efectos secundarios que pueden manifestarse en algunas personas. Los más comunes incluyen mareos leves, somnolencia ocasional y náuseas, aunque estos síntomas suelen ser transitorios y desaparecer con el tiempo. En raras ocasiones, se han reportado reacciones alérgicas graves como urticaria o edema de Quincke, lo cual requiere atención médica inmediata.Contraindicaciones ImportantesEs crucial tener en cuenta que este medicamento no debe ser utilizado en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquiera de sus componentes. Asimismo, está contraindicado en personas con asma grave o insuficiencia respiratoria avanzada, ya que podría empeorar su estado clínico. Además, su uso debe ser extremadamente cauteloso en mujeres embarazadas o lactantes, ya que aún no hay suficientes estudios que confirmen su seguridad absoluta en estos grupos poblacionales.Interacciones con otros medicamentos y sustanciasOtra consideración importante al utilizar la levodropropizina es la posible interacción con otros medicamentos o sustancias. Por ejemplo, cuando se combina con inhibidores de la enzima CYP450, encargada de metabolizarla en el hígado, puede haber un aumento en su concentración plasmática, incrementando así el riesgo de efectos adversos. También es recomendable evitar su uso simultáneo con alcohol u otros depresores del sistema nervioso central, ya que podría potencializar su efecto sedante.Además, si el paciente está tomando antidepresivos, antihistamínicos o corticosteroides, es vital consultar previamente con un médico para evaluar posibles conflictos farmacológicos.En cuanto a precauciones específicas, es esencial informar a un profesional sanitario sobre cualquier enfermedad preexistente antes de comenzar un tratamiento con levodropropizina. Esto incluye condiciones como hipertensión arterial, diabetes mellitus o cardiopatías isquémicas. Además, se sugiere monitorizar de cerca el progreso del paciente durante el tratamiento, especialmente si presenta síntomas persistentes o nuevos signos preocupantes.Uso en Poblaciones EspecialesRespecto al uso en embarazadas, actualmente no hay evidencia concluyente que demuestre su seguridad completa durante el embarazo; por ello, solo debe emplearse bajo supervisión médica rigurosa. En cuanto a los niños, las dosis deben ajustarse cuidadosamente según su peso y edad, utilizando exclusivamente formulaciones específicamente diseñadas para ellos.Alternativas y medicamentos similaresExisten varias alternativas al uso de la levodropropizina, dependiendo de las características particulares del caso clínico. Algunos medicamentos similares incluyen dextrometorfano, codeína y butambén, todos ellos pertenecientes al grupo de antitusígenos pero con mecanismos de acción ligeramente distintos. Cada uno tiene ventajas y desventajas que deben evaluarse individualmente por un profesional capacitado.Fuentes y referencias oficialesPara obtener información adicional y confiable sobre la levodropropizina y otros temas relacionados, se recomienda consultar las siguientes fuentes oficiales:MedlinePlusFDAOMSMayo ClinicEstas plataformas ofrecen recursos detallados y actualizados que pueden ayudarte a tomar decisiones informadas sobre tu salud y bienestar.